



NB: i farmaci con asterisco (*) non sono registrati in Italia per il trattamento dello SE

• **Controindicazioni**

- Fenitoina** : Blocco Atrio-Ventricolare (BAV), grave ipotensione
- Acido Valproico ***: disfunzione epatica, malattie mitocondriali, possibile tossicità pancreatica e disfunzione piastrinica
- Levetiracetam ***: insufficienza renale severa
- Lacosamide ***: BAV di II-III grado
- Fenobarbital**: insufficienza epatica, depressione respiratoria

• **Warning**

- Midazolam**: rischio di accumulo in pazienti obesi, anziani e insufficienza renale
- Propofol**: rischio di depressione cardio-circolatoria e «propofol infusion syndrome» (collasso cardio-circolatorio, ac. lattica, rhabdomiolisi, ipertrigliceridemia)
- Thiopentone**: rischio di ileo paralitico, immunosoppressione, edema linguale, ipernatremia
- Ketamina**: può indurre tachicardia e altre aritmie, ipertensione, aumento pressione intracranica

STESS (Status Epilepticus Severity Score)

	Caratteristiche	Punteggio
Coscienza	Vigile/sonnolento/confuso	0
	Stuporoso/comatoso	1
Peggior tipo di crisi	Parziale semplice, parziale complessa, Assenza, mioclonica	0
	Convulsiva generalizzata	1
	Stato epilettico non convulsivo in coma	2
Età	≤ 65 anni	0
	≥ 65 anni	2
Anamnesi	Si	0
	No / sconosciuto	1
Totale		

Score totale ≥ 4 predittivo di prognosi sfavorevole intraospedaliera
(Kagg, 2016; Rossetti, 2008)